

**PEPTIFAM® 10 mg**

Famotidine

**Description:**  
**PEPTIFAM®** (Famotidine) is a fast and an effective histamine H<sub>2</sub>-receptor antagonist. It inhibits the acid and pepsin content as well as the volume of basal and stimulated gastric secretion. Famotidine works by actually reducing the flow of excess stomach acid which can lead to heartburn pain, unlike antacids which neutralize existing stomach acid.  
One **PEPTIFAM®** 10 tablet controls stomach acid for up to 9 hours.  
**Properties:**  
After oral administration, the onset of antisecretory effect of Famotidine occurs within one hour and peak plasma levels occur within 1 - 3 hours. Famotidine bioavailability is about 40 - 45%, and it may be slightly increased by food, or slightly decreased by antacids. About 15 – 20% of Famotidine in plasma is protein bound. It is eliminated by renal (65 – 70%) and metabolic (30 – 35%) routes.

**Indications:**  
**PEPTIFAM®** 10 is indicated for:

- Fast and effective relief from heartburn, acid indigestion and upset or sour stomach due to excess stomach acid.
- Prevention of acid related symptoms brought on by consuming food and/or beverage.

**Dosage and administration:**  
*Adults and children 12 years of age or older:*

- Relief of the symptoms: Take one **PEPTIFAM®** 10 tablet.
- Prevention of acid related symptoms brought on by consuming food and/or beverage: Take one **PEPTIFAM®** 10 tablet, 15 minutes before eating.

**Patient notes:**

- If symptoms return, you may take another tablet.
- Do not take more than two tablets during a 24-hour period.
- If symptoms persist for more than two consecutive weeks, consult your doctor.
- Measures can be done to help in avoiding the heartburn:
  - Do not lie soon after eating.
  - If you are overweight, lose weight.
  - If you are a smoker, stop or cut down.
  - Avoid foods known to cause symptoms, and avoid or limit foods such as caffeine, chocolate, fatty foods, spicy foods and Alcohol.
  - Do not eat just before bedtime.

**Contraindications:**  
Hypersensitivity to any component of this product.

**PEPTIFAM® 10 mg**

Famotidine

**Description:**  
**PEPTIFAM®** (Famotidine) est un rapidement et une histamine efficace H<sub>2</sub>-receptor antagoniste. Il interdit le contenu d'acide et pepsine de même que le volume de sécrétion basale et stimulée gastrique. Famotidine travaille par réduisant en fait le flux d'acide d'estomac supplémentaire qui peut mener à la douleur de brûlure d'estomac, contrairement aux antiacides qui neutralisent l'acide d'estomac existant. Un **PEPTIFAM®** 10 acide d'estomac de contrôles de comprimé pour augmente à 9 heures.  
**Propriétés:**  
Après l'administration orale, le début d'effet d'antisecretory de Famotidine arrive dans une heure et dans les niveaux de plasma de sommet arrive dans 1 - 3 heures. Famotidine bioavailability est environ 40 - 45%, et il pourrait être légèrement augmenté par la nourriture, ou légèrement diminué par les antiacides. Environ 15 – 20% de Famotidine dans le plasma est la limite de protéine. Il est éliminé par rénal (65 – 70%) et du métabolisme (30 – 35%) les routes.

**Indications:**  
**PEPTIFAM®** 10 sont indiqués pour:

- Rapidement et le soulagement efficace de la brûlure d'estomac, la crise de foie acide et a dérangé ou pourrit le dû d'estomac trop acide d'estomac.
- L'Empêchement d'acide a relaté des symptômes ont provoqué en consommant la boisson de et/ou de nourriture.

**Dosage et administration:**  
*Les adultes et les enfants 12 années majeures ou plus vieilles:*

- Le Soulagement des symptômes: Prendre un **PEPTIFAM®** 10 comprimé.
- L'Empêchement d'acide a relaté des symptômes ont provoqué en consommant la boisson de et/ou de nourriture: Prendre un **PEPTIFAM®** 10 comprimé, 15 minutes avant de manger.

**Le malade note:**

- Si les symptômes retournent, vous pouvez prendre une autre comprimé.
- Ne pas prendre plus de deux comprimés pendant une période de 24 heures.
- Si les symptômes persistent pour plus que deux semaines consécutives, consulter votre médecin.
- Les Mesures peuvent être faites pour aider dans éviter la brûlure d'estomac:
  - Ne pas coucher peu après mangeant.
  - Si vous êtes obèse, maigrissez.
  - Si vous êtes fumeur, l'arrêt ou la coupure en bas.
  - Eviter des nourritures connues pour causer des symptômes, et éviter ou limiter des nourritures telles que caféine, le chocolat, les nourritures grasses, les nourritures et l'Alcool épicés.
  - Ne pas manger juste avant l'heure du coucher.

**Contre-indications:**  
L'hypersensibilité n'importe quel composant de ce produit.

**ببتيفام® ١٠ ملغم**  
قاموتيدين

**الوصف:**  
**ببتيفام®** (قاموتيدين) هو مضاد سريع وفعال لمستقبلات الهستامين هـ<sub>٢</sub>. يقلل من محتوى الحمض والببسين كما ويقلل حجم الإفرازات المعدية الأساسية والمستحثة.  
يعمل قاموتيدين على تقليل تنفق حمض المعدة الزائد الذي قد يؤدي إلى ألم حرقة الفؤاد، ويعكس مضادات الحموضة التي تعمل على معادلة حمض المعدة الموجود.  
يتحكم قرص واحد من **ببتيفام®** ١٠ في حمض المعدة لغاية ٩ ساعات.  
**الخواص:**  
يظهر الفعل المضاد للإفراز خلال ساعة بعد تناول الجرعة الفموية من قاموتيدين، وتصل تراكيزه في البلازما إلى الذروة خلال ١ - ٣ ساعات.  
يبلغ التوافر الحيوي لقاموتيدين تقريباً ٤٠ - ٤٥٪، ويمكن أن يزيد بصورة طفيفة إذا أخذ مع الطعام، أو يقل بشكل طفيف إذا أخذ مع مضادات الحموضة.  
يرتبط حوالي ١٥ - ٢٠٪ من قاموتيدين في البلازما بالبروتينات، ويطر عن الطريق البولي (٦٥ - ٧٠٪) والطريق الأيضي (٣٠ - ٣٥٪).  
يوصى باستعمال **ببتيفام®** ١٠ في:

- تخفيف الألم المصاحب لحرقة الفؤاد بشكل سريع وفعال، عسر الهضم بسبب الحمض وإضطراب أو تجمض المعدة بسبب زيادة حمض المعدة.
- منع الأعراض المرتبطة بزيادة حمض المعدة بسبب تناول الطعام و/أو الشراب.

**الجرعات وطريقة الإستعمال:**  
البالغين والأطفال من عمر ١٢ سنة فما فوق:

- تخفيف الأعراض: تناول قرص واحد من **ببتيفام®** ١٠.
- منع الأعراض المرتبطة بزيادة حمض المعدة بسبب تناول الطعام و/أو الشراب: تناول قرص واحد من **ببتيفام®** ١٠، قبل تناول الطعام بـ ١٥ دقيقة.

**ملاحظات للمريض:**

- يمكن تناول قرص أخر وذلك عند عودة الأعراض.
- يجب عدم تناول أكثر من قرصين خلال فترة الـ ٢٤ ساعة.
- يجب إستشارة الطبيب وذلك عند إستمرار الأعراض لأكثر من أسبوعين متتاليين.
- الإجراءات التي يمكن عملها للمساعدة في منع حدوث حرقة الفؤاد:
  - عدم الإستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة.
  - تقليل الوزن، إذا كنت من ذوي الأوزان الثقيلة.
  - التوقف عن أو تقليل التدخين، إذا كنت من المدخنين.
  - الإمتناع عن تناول الأطعمة المعروفة بأنها تسبب لك الأعراض، والإمتناع أو تقليل الأطعمة مثل الكافيين، الشوكولاتة، الأطعمة الدهنية، الأطعمة الحارة والكحول.
  - عدم تناول الطعام قبل الخلود للنوم.

**موانع الإستعمال:**  
فرط الحساسية لأي من مكونات هذا المستحضر.

Precautions:

This medicine may not be suitable for some people. Consult with your doctor or pharmacist before using if you:

- Have difficulty in swallowing or have persistent abdominal discomfort (stomach pain).
- Have severe kidney disease or any other severe illnesses.
- Are over 40 and you are experiencing new or recently changed symptoms of acid indigestion or heartburn.
- Are taking any prescription or over-the-counter medications such as non-steroidal anti-inflammatory drugs [NSAIDs] (because these NSAIDs may be causing your symptoms).
- Have a previous history of ulcer disease complications.
- Are experiencing unintended weight loss in association with your symptoms of acid indigestion or heartburn.

Use during pregnancy and lactation:

Pregnancy category **B**

**Pregnancy:** Famotidine should be used during pregnancy only if clearly needed.

**Lactation:** Famotidine has been detected in human milk and because of the potential for serious side effects in nursing infants; a decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Drug interactions:

- No drug interactions have been identified with Famotidine.
- No significant interference with the deposition of compounds (e.g., Warfarin, Theophylline, Phenytoin, Diazepam, Aminopyrine and Antipyrine) metabolized by the hepatic enzymes, e.g., cytochrome P 450 system has been identified.
- Famotidine decreases serum levels of Ketoconazole and Itraconazole due to reducing their absorption.
- Ethanol should be avoided with Famotidine, as it may cause gastric irritation.

Side effects:

Famotidine is generally well tolerated.

Should any unusual symptoms occur, consult your doctor.

Overdosage:

Oral doses of up to 40 mg/day have been given to patients with no serious side effects.

In the event of overdosage, treatment should be symptomatic and supportive.

Unabsorbed material should be removed from the gastrointestinal tract, the patient should be monitored and supportive therapy should be employed.

Storage conditions:

Store between 15 - 30 °C.

Presentation:

**PEPTIFAM® 10 mg Tablets:** Each film coated tablet contains Famotidine 10 mg in packs of 10 tablets.

*Hospital packs are also available.*

<p><b>This is a medicament</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.</li><li>• Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.</li><li>• The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.</li><li>• Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.</li><li>• Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.</li><li>• Keep medicament out of the reach of children.</li></ul>	<p><b>COUNCIL OF ARAB HEALTH MINISTERS UNION OF ARAB PHARMACISTS</b></p>
---	--

The United Pharmaceutical Manufacturing Co. Ltd.  
P.O. Box 69 Amman 11591, Jordan

Précautions:

Cette médécine ne peut pas être convenable pour quelques gens. Consulter avec votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser si vous:

- Avoir la difficulté dans l'avalement ou avoir le malaise abdominal persistant (la douleur d'estomac).
- Avoir la maladie sévère de rein ou les autres maladies sévères.
- Sont par-dessus 40 et vous éprouvez nouvel ou récemment changé les symptômes de crise de foie ou la brûlure d'estomac acide.
- Prennent n'importe quelle prescription ou n'importe quels médicaments en vente libre tels que non-steroidal les drogues anti-incendiaries [NSAIDs] (parce que ces NSAIDs peut causer vos symptômes).
- Avoir une histoire précédente de complications de maladie d'ulcère.
- Éprouvent la perte accidentelle de poids dans l'association avec vos symptômes de crise de foie ou la brûlure d'estomac acide.

Grossesse et Allaitement:

Categorie **B** de la grossesse

**Grossesse:** Famotidine devrait être utilisé pendant la grossesse seulement si clairement nécessaire.

**Lactation:** Famotidine a été détecté dans le lait humain et à cause du potentiel pour les effets secondaires sérieux dans soigner de bébés; une décision devrait être faite s'interrompre soigner ou interrompt le drogue, tenant compte de l'importance du drogue à la mère.

Interactions médicamenteuses:

- Aucune interactions de drogue ont été identifiées avec Famotidine.
- Aucune intervention significative avec la déposition de composés (par ex., Warfarin, Theophylline, Phenytoin, le Diazepam, Aminopyrine et Antipyrine) transformé par métabolisme par les enzymes hépatiques, e.g., cytochrome P 450 système a été identifié.
- Famotidine diminue les niveaux de sérum de Ketoconazole et Itraconazole en raison de réduire leur absorption.
- L'Ethanol devrait être évité avec Famotidine, comme il peut causer l'irritation gastrique.

Effets indésirables:

Famotidine bien est généralement toléré.

Devoir des symptômes insolites arrivent, consultez votre médecin.

Surdosage:

Les doses orales d'augmente à 640 mg/jour a été donné aux malades avec aucuns effets secondaires sérieux. En cas d'overdosage, le traitement doit être symptomatique et qui soutient. Unabsorbed matériel devrait être enlevé de l'étendue gastro-intestinale, le malade devrait être contrôlé et la thérapie qui soutient devrait être employée.

Conditions de conservation:

Conservier entre 15 - 30 °C.

Présentation:

**PEPTIFAM® 10 mg Comprimés:** Chaque comprimé pelliculé contient 10 mg de Famotidine dans des boîtes de 10 comprimés.

*Des boîtes hospitalières sont aussi disponibles.*

<p><b>Ceci est un médicament</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le médicament est un produit qui agit sur votre santé, et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.</li><li>• Suivre strictement la prescription de votre médecin, le mode d'emploi et les instructions du pharmacien qui vous a vendu le médicament.</li><li>• Le médecin et le pharmacien sont des experts en médicament, ses avantages et ses risques.</li><li>• Ne pas interrompre la période du traitement, prescrite de votre initiative sans consulter votre médecin.</li><li>• Ne pas répéter la même prescription sans consulter votre médecin.</li><li>• Garder le médicament hors de la portée des enfants.</li></ul>	<p><b>LE CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTÉ L'UNION DES PHARMACIENS ARABES</b></p>
---	--

The United Pharmaceutical Manufacturing Co. Ltd.  
P.O. Box 69 Amman 11591, Jordanie



محاذير الإستعمال:

يمكن أن يكون هذا الدواء غير ملائم لبعض الأشخاص. يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل الإستعمال إذا كنت:

- تعاني من صعوبة في البلع أو عدم راحة مستمرة في البطن (الم في المعدة).
- تعاني من مرض شديد في الكلىة أو أي امراض أخرى شديدة.
- تبلغ من العمر اكبر من ٤٠ عاماً وتعالني من أعراض حديدية أو متغيرة لحداث عسر الهضم بسبب الحمض أو قرحة الفؤاد.
- تتناول أدوية مسروفة بوصفة طبية أو غير مسرووفة بوصفة طبية مثل أدوية مضادات الإلتهاب اللاستيرويدية [NSAIDs] (لأن هذه الأدوية قد تسبب لك الأعراض).

• تعالني من تاريخ مرضي مسبق لحداث مضاعفات لمرض القرحة.

• تعالني من فقدان وزن غير متمعد بالإضافة إلى أعراض عسر الهضم بسبب الحمض أو قرحة الفؤاد.

الإستعمال خلال فترتي الحمل والإرضاع:

فئة الحمل ب

**الحمل:** يستعمل فاموتيدين خلال فترة الحمل فقط إذا دعت الحاجة لذلك.

**الرضاعة:** تم رصد فاموتيدين في حليب الأم وبسبب احتمالية حدوث أعراض جانبية ذات أهمية لدى الأطفال الرضع؛ فيجب أخذ القرار إما بالتوقف عن الرضاعة أو التوقف عن إستعمال الدواء، مع الأخذ بعين الإعتبار أهمية الدواء للأم.

التداخلات الدوائية:

- لم يتم رصد أي تداخلات دوائية مع فاموتيدين.

• لا يوجد أي تداخل ذو أهمية أدى إلى تراكم مواد (مثل افرارفين، ثيوفيللين، فينيتوين، ديازيبام، أمونيوبايرين وأنتيباييرين) والتي يتم إستقلابها بواسطة الإنزيمات الكبدية مثل نظام سيتوكروم P٤٥٠.

• يقلل فاموتيدين من مستويات كيتوكينازول وإيتراكونازول الموجودة في المصل وذلك بسبب تقليله من إمتصاص هذه الأدوية.

• يجب تجنب تناول الإيثانول مع فاموتيدين وذلك بسبب إحتمالية حدوث تهيج في المعدة.

الأعراض الجانبية:

يعتبر فاموتيدين بشكل عام جيد التحمل.

يجب إستشارة الطبيب عند حدوث أية أعراض جانبية غير طبيعية.

فرط الجرعة:

لم تظهر أية أعراض جانبية ذات أهمية عند تناول جرعات فموية وصلت لغاية ٦٤٠ ملغم/يوم.

يجب أن يخضع المريض، في حالة حدوث فرط الجرعة، للعلاج العرضي والداعم.

يجب إزالة المادة غير الممتصة من الجهاز الهضمي ويوضع المريض تحت المراقبة والعلاج الداعم.

ظروف الحفظ:

يحفظ بين ١٥ - ٣٠°م.

كيفية التزويد:

**بيتيهام® ١٠ ملغم أقراص:** كل قرص مغلف يحتوي على فاموتيدين ١٠ ملغم في عبوات سعة ١٠ أقراص.

عبوات المستشفيات متوفرة أيضاً.

<p><b>إن هذا دواء</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.</li><li>• إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.</li><li>• إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ولنقلعه وضروه.</li><li>• لا تمنع مدة العلاج الممددة لك من لقاء نبتك.</li><li>• لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.</li><li>• احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.</li></ul>	<p><b>مجلس وزراء الصحة العرب اتحاد الصيدلة العرب</b></p>
---	--

الشركة المتحدة لصناعة الأدوية ذ.م.م  
ص.ب ٦٩ عمان ١١٥٩١ الأردن